

## ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ВИДУ АНТИПСИХОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Бухарский государственный медицинский институт

имени Абу Али ибн Сино

Тилавов Маъруф Тулкинович

**Ключевые слова:** антипсихотическая терапия, возраст, пол, типичные антипсихотики, атипичные антипсихотики, комбинированная терапия.

**Актуальность.** Изучение структуры антипсихотической терапии в различных половозрастных группах имеет значение для характеристики исследуемого контингента и последующего анализа клинических результатов. Различия в распределении вариантов лечения необходимо учитывать при формировании сопоставимых групп пациентов.

**Цель исследования.** Изучить половозрастные особенности распределения пациентов в зависимости от вида применяемой антипсихотической терапии.

**Материалы и методы.** Проанализировано распределение 170 пациентов, включая 84 мужчины и 86 женщин. В зависимости от возраста пациенты были разделены на две категории: 18-44 и 45-59 лет. В каждой половозрастной группе оценивали число пациентов, получавших типичные антипсихотики, атипичные антипсихотики или комбинированную терапию. Результаты представлены в абсолютных значениях и процентах, рассчитанных отдельно от общего числа мужчин и женщин.

**Результаты.** Среди мужчин 40 пациентов относились к возрастной группе 18-44 лет, 44 - к группе 45-59 лет. В младшей возрастной категории наиболее многочисленной была группа получавших атипичные антипсихотики - 20 пациентов (23,8% от общего числа мужчин). Комбинированная терапия применялась у 12 (14,3%), типичные препараты - у 8 мужчин (9,5%). В возрасте 45-59 лет преобладала комбинированная терапия - 25 пациентов (29,8%). Атипичные антипсихотики получали 13 (15,5%), типичные - 6 пациентов (7,1%). При суммировании обеих возрастных категорий комбинированная терапия была зарегистрирована у 37 мужчин, атипичные препараты - у 33, типичные - у 14.

Среди женщин 46 пациенток находились в возрасте 18-44 лет, 40 - в возрасте 45-59 лет. В младшей возрастной группе атипичные антипсихотики

получала 21 пациентка (24,4% от общего числа женщин), комбинированную терапию - 15 (17,4%), типичные препараты - 10 пациенток (11,6%). У женщин 45-59 лет также преобладали атипичные антипсихотики - 19 случаев (22,1%). Комбинированная терапия применялась у 16 (18,6%), типичные препараты - у 5 пациенток (5,8%). В общей сложности атипичные антипсихотики получали 40 женщин, комбинированную терапию - 31, типичные препараты - 15.

В возрастной группе 18-44 лет распределение вариантов лечения у мужчин и женщин имело сходную направленность: наиболее часто применялись атипичные антипсихотики, второе место занимала комбинированная терапия. В возрасте 45-59 лет структура терапии различалась: среди мужчин наиболее многочисленной была группа комбинированной терапии, тогда как среди женщин сохранялось преобладание атипичных препаратов. Наиболее выраженное возрастное различие отмечалось у мужчин, получавших комбинированную терапию: их число составляло 12 в возрасте 18-44 лет и 25 в возрасте 45-59 лет. Типичные антипсихотики были наименее представленным вариантом лечения во всех анализируемых половозрастных группах.

### **Выводы.**

1. Структура антипсихотической терапии различалась в зависимости от пола и возрастной категории пациентов: в возрасте 18–44 лет у мужчин и женщин преобладали атипичные антипсихотики, тогда как в возрасте 45–59 лет у мужчин наиболее часто применялась комбинированная терапия, а у женщин — атипичные препараты.
2. При сопоставлении возрастных групп мужчин отмечалось увеличение числа пациентов, получавших комбинированную терапию, с 12 до 25 случаев при одновременном уменьшении числа получавших атипичные антипсихотики с 20 до 13 случаев. У женщин распределение этих вариантов лечения было более равномерным.
3. Типичные антипсихотики занимали наименьшую долю во всех исследованных половозрастных группах. Выявленные особенности отражают структуру представленной выборки и требуют статистической проверки при дальнейшем сравнительном анализе.